

Urologie

BLAASFUNCTIEMETING URODYNAMISCH ONDERZOEK

poliklinisch



Binnenkort wordt u op de polikliniek Urologie verwacht voor een blaasfunctiemeting. Voorafgaand aan het onderzoek wordt er een plasstraal meting en urine onderzoek gedaan. Hierna neemt u plaats in de wachtkamer. Zodra u aan de beurt bent, wordt u opgehaald.

In deze folder leest u over het onderzoek en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw uroloog. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Urologie als u vragen heeft. **Lees deze folder goed door.**

WAT IS EEN BLAASFUNCTIEMETING?

Een blaasfunctiemeting is een inwendig onderzoek om te kijken waar uw plasklachten vandaan komen (urodynamisch onderzoek). Misschien kunt u moeilijk plassen (obstructie) of verliest u ongewild urine (incontinentie). Nadat uw blaasfunctie is gemeten, kan de uroloog u een gerichte behandeling geven. De meting wordt gedaan door een verpleegkundige.

WAT WORDT ER GEMETEN MET EEN BLAASFUNCTIEMETING?

Met dit onderzoek wordt de functie van uw blaas onderzocht.

- de blaasinhoud
- de blaasdruk
- de afsluiting van de blaas
- eventueel urineverlies
- de snelheid waarmee de urine uitstroomt
- de spanning in de bekkenbodemspieren.

DE DAG VAN HET ONDERZOEK

- U komt met een volle blaas naar het ziekenhuis. Behalve als u een katheter heeft of als u ernstig urineverlies heeft.
- U stopt met de medicijnen die voor de blaas zijn voorgeschreven, behalve als het anders staat vermeld.
- Antibiotica en andere medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken.
- Het is belangrijk dat u de ochtend van het onderzoek heeft gepoept. Gebruik hiervoor eventueel de dulcolax zetpil (bisocadyl).

DUUR ONDERZOEK

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

VÓÓR HET ONDERZOEK

- Uw bovenkleding kunt u aanhouden, uw onderkleding moet u uittrekken. Draag daarom kleding die u gemakkelijk kunt aan- en uittrekken.
- U ligt met opgetrokken en gespreide benen op de onderzoekstafel.
- Uw vagina/penis wordt schoongemaakt.
- De verpleegkundige brengt een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas.
- Het restje urine dat nog in de blaas aanwezig is wordt gemeten via de katheter.
- Hierna krijgt u een dun drukkathetertje in de blaas. Hiermee wordt de druk in uw blaas en plasbuis gemeten.
- Er wordt een klein slangetje via de anus in de endeldarm ingebracht. Hiermee wordt de druk in de buik gemeten.
- Het inbrengen van de slangetjes kan onaangenaam voelen, maar is niet pijnlijk.
- Om te zorgen dat de slangetjes op hun plaats blijven, worden ze op uw huid vastgeplakt met pleisters.
- Op uw billen worden elektrodenplakkers vastgemaakt. Met de plakkers wordt de activiteit van de bekkenbodemspieren gemeten.

HET ONDERZOEK

Het onderzoek vindt bijna altijd in zittende houding plaats.

- Via het slangetje in de blaas wordt uw blaas gevuld met steriel water.
- Tijdens het vullen wordt de druk in uw blaas gemeten. Met de drukkatheter in de endeldarm wordt de druk in uw buik gemeten.
- Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen, moet u dit aangeven.
- Tijdens het onderzoek moet u een paar keer hoesten of persen. Vooral als u last heeft van ongewild urineverlies (incontinentie).
- Uw blaas wordt verder gevuld, totdat u aangeeft dat u uw plas niet meer kunt ophouden. Dan wordt het vullen gestopt.
- U moet uitplassen langs het slangetje in de blaas, als de verpleegkundige hierom vraagt.
- De slangetjes en plakkers worden weggehaald als het onderzoek is afgelopen.

NA HET ONDERZOEK

Wat kunt u verwachten?

- U kunt op de dag van het onderzoek een pijnlijk en branderig gevoel hebben tijdens en na het plassen.
- U kunt het gevoel hebben dat u constant moet plassen. Dit komt omdat uw plasbuis geïrriteerd is door de slangetjes. Het is mogelijk dat u deze klachten een paar dagen blijft houden. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken.
- Soms verliest u bloed via de plasbuis of krijgt u een urineweginfectie. Ook als u al antibiotica gebruikte.
- Na het onderzoek moet u extra veel drinken.

DE UITSLAG

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. U krijgt u hiervoor een afspraak.

NAAR HUIS

U kunt op eigen gelegenheid naar huis.

WANNEER MOET U CONTACT OPNEMEN?

In de volgende situaties kunt u contact met ons opnemen:

- U heeft constante pijn die niet overgaat. Ook niet door het nemen van pijnstillers vier keer per dag twee tabletten paracetamol van 500 mg.
- U heeft koorts boven de 38,5°C of u heeft langer dan 24 uur koorts boven de 38°C.
- U kunt moeilijker plassen.


AFSPRAAK VERZETTEN

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

VRAGEN

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De medewerkers van de afdeling Urologie geven u graag meer informatie.

POLIKLINIEK UROLOGIE

 0344-674040

AANTEKENINGEN

A series of horizontal dotted lines for taking notes, starting below the heading 'AANTEKENINGEN' and ending just above the footer text.

Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:

 0344-674911
 info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

